

Faut il traiter les immunotolérants et les porteurs inactifs?

Mustapha Benazzouz (Maroc)

Nathalie Boyer (France)


Jean-Francois Cadranel (France)

Faut il traiter les immunotolérants et les porteurs inactifs?

La réponse repose sur
l'histoire naturelle
de
l'hépatite chronique B ...

HEPATITE CHRONIQUE B


Histoire naturelle



HEPATITE CHRONIQUE B

Histoire naturelle

5 phases de l'hépatite chronique B



Hépatite Chronique B

Tolérance immunitaire

Clairance immunitaire

Porteur inactif

ADN VHB

ALT

Phases pas toujours séquentielles et durée variable selon les individus

Réactivation

HCA AgHbe positif

Ag HBe

Anti-HBe

Ag HBs

+

-

+

-

+

+

±

±


+

-

+

+

-



| | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|
| Ag HBe | + | - | ± | - | - |
| Anti-HBe | - | + | ± | + | + |
| Ag HBs | + | + | + | + | - |

Traiter ou ne pas traiter ?

- le patient immunotolérant
- le porteur inactif

..... Comment faire le diagnostic ?

Traiter ?

- le patient immunotolérant
- le porteur inactif

..... Pourquoi ?

Ne pas traiter ?

Parce que ...

- Maladie hépatique bénigne ?
- Non fibrosante ?
- Risque de complications quasiment nul ?

.....circonstances particulières

Faut il traiter les immunotolérants et les porteurs inactifs?

- **Cas cliniques:**
 - - le patient immunotolérant:
 - **Adriana Popescu (Roumanie)**
 - - le porteur inactif:
 - **Rachid Ould Gougam (Algérie)**